

Fauna nativa que aún se puede ver



Halconcito común

Falco sparverius

Otros nombres: Halconcito colorado (Argentina), quiriquiri (Brasil), cernícalo americano (Chile).

Identificación: Halcón pequeño, de 26 cm de longitud. Zona dorsal rufa con manchas negras. El macho tiene plumaje gris azulado en la corona y en las alas. Zona ventral blanca con punteado negro. La hembra es un poco mayor; tiene alas rojizas barradas de negro y presenta fino estriado ocre en el vientre. Los juveniles son más pálidos que los adultos.

Distribución: Desde Alaska hasta Tierra del Fuego.

Hábitat: Praderas abiertas y ambientes urbanos.

Comportamiento: Solitario o en pareja. Para cazar halconeando o se lanza hacia el suelo desde una percha.

Se alimenta de pequeños reptiles, arácnidos, insectos, anfibios, roedores y pequeñas aves. Las hembras, al tener mayor tamaño, pueden capturar torcazas, homeros y pechos colorado.

Reproducción: La cópula ocurre en la parte alta de los árboles. Nidifica en primavera. Suele emplear nidos abandonados de carpinteros, homeros, espineros y cotorras. También utiliza huecos de la vivienda humana. Pone de 3 a 5 huevos manchados con fondo claro. La incubación dura entre 27 y 32 días. Los pichones son blancos al nacer.

Situación poblacional: Preocupación Menor (LC-UICN) a nivel nacional y global.

Curiosidades: Estos halcones tienen un diseño especial en la nuca, presentan manchas que simulan ojos y pico. Esto es un mecanismo antipredatorio, ya que los depredadores no atacan si la posible presa los está mirando.

Dónde lo puedo ver: En cables, postes y alambrados a lo largo de carreteras, en áreas abiertas con vegetación corta y pocos árboles. En las ciudades se lo ve posado en columnas y en árboles.

Verónica Arburúas



Mónica Prior



HEMBRA

Verónica Arburúas



Marta Martínez



Mano pelada

Procyon cancrivorus



Huella de pata trasera.

Alejandro Piña

Otros nombres: Aguará popé, mayuato, osito lavador, cangrejero o manglero, mapache austral, mapachín, zorra patona, **MÃO-PELADA**.

Identificación: Mide 1,25m de longitud y pesa hasta 10kg. Pelaje grisáceo. Cara blancuzca con antifaz negro sobre los ojos. Cola negra con anillos blanco-amarillentos. Patas y manos carentes de pelo, con dedos finos y largos. Frecuentemente se encuentran sus huellas características y muy fáciles de reconocer.

Distribución: Centroamérica desde Costa Rica hasta América del Sur excepto Chile. Presente en todo el territorio.

Hábitat: Montes galería, orillas de lagunas, arroyos, cañadas, ríos, bañados.

Comportamiento: Nocturno, solitario. Se alimenta principalmente

de cangrejos que atrapa tanteando debajo del agua. Come camarones, peces, aves pequeñas, huevos, caracoles, insectos, ranas y tortugas. Frutas y semillas también forman parte de su dieta. Curioso, esquivo y desconfiado. Se refugia en huecos de árboles, grietas en rocas, madrigueras de otros animales y hasta instalaciones humanas abandonadas. Excelente trepador.

Reproducción: La hembra pare entre 2 y 5 crías en primavera, luego de una gestación entre 60 y 65 días.

Situación poblacional: Mientras que a nivel global se encuentra bajo la categoría Preocupación Menor (LC-UICN), en nuestro país su situación es catalogada como Vulnerable (VU UICN).



Francisco Rebollo Paz

Curiosidades: El género *Procyon* proviene del griego, **pro:** "antes de" y **kyôn:** perro. Se considera que este género sería un ancestro evolutivo de los cánidos. El epíteto

cancrivorus proviene del latín **cáncer:** cangrejo y **vor:** devorador. En guaraní aguará popé se traduce como "zorro de mano extendida".

Dónde lo puedo ver: Cerca de cursos de agua, donde lavan su alimento minuciosamente antes de ingerirlo.

Natalia Villar