

Fauna nativa que aún se puede ver



Naranjero *Thraupis bonariensis*

Otros nombres: Tangara naranjera, sietecolores, chogüí, llayle (Chile).

Identificación: Mide 17 cm. Presenta dimorfismo sexual.

Macho: cabeza y cuello azul brillante. Lorum (zona comprendida entre los ojos y las fosas nasales), alas, dorso superior y cola de color negro azulado. Pecho, vientre y rabadilla de color amarillo anaranjado brillante.

Macho juvenil: Similar a la hembra pero con capuchón con reflejos grises azulados.

Hembra: de coloración opaca. Cuerpo gris pardusco, más claro en la parte ventral. Rabadilla en tonalidades tenues de amarillo.

Distribución: Ecuador, Perú, Brasil, Bolivia, Chile, Argentina, Paraguay y Uruguay. Presente en todo el territorio.

Hábitat: Bordes de montes ribereños, de quebradas y serranos, praderas arboladas.

Comportamiento: Solitario o en pareja. De naturaleza esquiva. Se alimenta principalmente de frutos (nativos y cultivados), flores, brotes tiernos, semillas e insectos. Casi no baja al suelo.

Reproducción: Nidifica desde noviembre hasta finales de enero. Construye nido en forma de tazón con ramas entrelazadas, hojas secas, líquenes y musgo en

la parte media y alta de los árboles. Pone de 2 a 4 huevos color blanco oliváceo con manchas pardas.

Situación poblacional: Bajo la categoría Preocupación Menor a nivel global y nacional (LC-UICN).

Curiosidades: Debido a su llamativo colorido es una especie muy perseguida por los tramperos que lo comercializan como ave de jaula, a pesar de ser un ave que no soporta por mucho tiempo estar bajo esta condición, llevando esto a su muerte prematura.

Dónde lo puedo ver: En zonas cultivadas, matorrales, parques y jardines de zonas urbanas.

Natalia Villar



Marcos López



Martina Odeña



Tinambú Ecología



Yara *Bothrops pubescens*

Otros nombres: Yarárá (Uruguay), Jararaca-pintada o Jararaca-do-pampa (Brasil).

Identificación: De 22 a 90 cm de longitud. Aspecto robusto y cola corta; cabeza triangular en vista dorsal, terminando en un hocico redondeado.

Coloración gris. Presenta manchas en forma de trapecios y sobre los flancos tiene manchas redondeadas. La hembra es mayor que el macho. Las crías tienen el extremo de la cola amarillento.

Distribución: Desde Río Grande del Sur (Brasil) hasta Uruguay.

Hábitat: Sierras pedregosas, praderas rocosas, siendo menos frecuente en zonas bajas y húmedas.

Comportamiento: Tiene actividad crepuscular y nocturna. Frente al peligro responde agresivamente. Enrolla el cuerpo y posiciona la cabeza, dejando el cuello en "S" para lanzar el ataque.

Se alimenta de pequeños mamíferos, aves, anfibios y reptiles.



Hugo Fleitas



Mauricio Alvarez

Reproducción: Vivípara. Pare entre 2 y 18 crías en marzo-abril.

Situación poblacional: Preocupación Menor (LC-UICN) a nivel global y local. Especie prioritaria para la conservación por el potencial de explotación comercial de la ponzoña.

Curiosidades: Es una de las cuatro especies más peligrosas de Uruguay. A veces se refugia en

pilas de leña o entre las piedras; puede acercarse a las viviendas. En caso de accidente hay que trasladar a la persona al centro asistencial más cercano para que reciba suero antiofídico.

La herida debe mantenerse en posición de descanso y efectuar sobre ella, solamente, su desinfección y lavado. Debemos tener en cuenta que los ataques ocurren

por accidente; la yara cumple un rol fundamental en el control de roedores que provocan graves enfermedades al ser humano.

Dónde la puedo ver: En ambientes adecuados de: Rivera, Tacuarembó, Cerro Largo, Treinta y Tres, Rocha, Lavalleja, Maldonado, Canelones y en Sierra de Mahoma (San José).

Verónica Arburúas