



Pirincho Común

Guira guira

Otros Nombres : Cuco Guira o Serere (Bolivia), Urraca (algunas zonas de Argentina), Anu Branco (Brasil)

Identificación: 40 cm de talla y un peso que puede llegar a los 200 grs. Copete despeinado acanelado, dorso parduzco estriado de blanco y larga cola tricolor (negro al centro). Lomo y rabadilla blancuzcos y ventral ocráceo. Pico naranja

Distribución: Desde el NE de Brasil hasta Bolivia, Paraguay y Uruguay hasta el centro de Argentina

Hábitat: Bordes de montes y todos los ambientes arbolados, incluso urbanos

Comportamiento: Grupos bullangueros que buscan alimento desplazándose por el suelo o árboles. A menudo en invierno, de espaldas al sol como proporcionándose calor. Se alimentan de artrópodos, reptiles pequeños, algunas ranas, pichones de otras aves e incluso ratones (oportunistas)

Reproducción: De octubre a Febrero, construyen un nido en forma de tazón con palitos y tallos de yuyos, donde varias hembras depositan sus huevos (celestes con pintas blancas) en número promedio de 10 y 12

Status y Conservación: Es un residente permanente y común en nuestro país, categorizado como "Preocupación Menor" (LC-UICN)

Curiosidades: El copete desordenado da a lugar en la cultura popular a la creación de apodos que se aplica a la gente de cabellos despeinados especialmente en la parte de atrás de la cabeza.

Dónde lo puedo ver: En prácticamente todos los ambientes arbolados y abiertos del país, incluso urbanos. Se puede detectar su presencia cercana por su canto constituido por una sucesión descendente de fuertes voces.

Fauna nativa que aún se puede ver



Pedro Rinaldi



Natalia Villar



Avistamiento de aves (Birdwatching)

El avistamiento de aves con fines recreativos se remonta a finales del siglo XVIII, pero es durante la era victoriana que esta actividad comienza a tener gran aceptación por el público en general. En aquel entonces se practicaba de manera extractivista, coleccionándose los huevos y luego las plumas, convirtiéndose estas últimas en preciados artículos de moda para la época. El término observación de aves se utilizó por primera vez en 1901 por Edmund Selous, un ornitólogo y escritor británico. Esta industria mueve muchísimo dinero. Por ejemplo, en EEUU (donde hay aprox. 46 millones de observadores), se estima que la actividad genera cerca de US\$ 32.000 millones anuales. En cambio, en América Latina, región del mundo con mayor riqueza en aves, la actividad está poco explotada (con excepción de algunos países). Uruguay, por muchas características de nuestro país, posee un potencial enorme del cual el estado aún no se ha percatado.

Este pasatiempo conlleva mucha paciencia. La vista y el oído son los dos sentidos fundamentales. Las épocas más activas para el avistamiento son la primavera y el otoño, acompañando los recambios migratorios. El amanecer y el atardecer son los momentos del día más propicios, siendo el amanecer insuperable, ya que las aves se encuentran más activas y vocalizando, haciendo que sea más fácil el encontrarlas.



¿Qué precisamos para avistar aves?

Vestimenta adecuada, en tonalidades apagadas para así camuflarnos con el entorno. Un buen gorro para protegernos, protector solar y repelente. Calzado cómodo o unas buenas botas de goma, de caña alta en lo posible, por si nos adentramos a zonas húmedas o pastizales altos (protección contra ofidios). Otros implementos necesarios aunque no imprescindibles son: binoculares, guía de identificación de aves, libreta para anotar las especies observadas, cámara fotográfica.

Y fundamentalmente, muchas ganas de disfrutar de la naturaleza.



Hurón

Galictis cuja

Otros nombres: Hurón menor, Quique, furão, grisón andino, juruna.

Identificación: De cuerpo alargado y aplanado que termina en una corta cola. Alcanza 76cm de longitud y 2,5kg de peso. Coloración general contrastada, de pelaje dorsal amarillo grisáceo mezclado con negro mientras su cara, cuello y pecho es de color negro. Con muy poca frecuencia hay individuos de coloración uniforme (dorso y vientre oscuros). Presenta dos franjas blancas distintivas que van por ambos lados de la cabeza desde la frente hacia el cuello, a modo de vincha. Sus pastas son cortas y negras.

Distribución: Nativo de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Perú, Paraguay y Uruguay.

Hábitat: Vive en ambientes muy variados, montes, pastizales, médanos costeros.

Comportamiento: Si bien

es principalmente nocturno a veces tiene actividad también en horas diurnas. Solitario, aunque puede observarse en pareja o formando pequeños grupos familiares trasladándose en fila.

Predador activo y agresivo tiene preferencia por roedores, ejerciendo un rol muy valioso como predador del ratón colilargo (transmisor del virus Hanta). También se alimentan de frutas, pequeños reptiles, anfibios, aves, huevos e invertebrados.

Reproducción: Monógamo. Pare de 2 a 4 crías en primavera luego de una gestación de 40 días.

Situación poblacional: En nuestro país y globalmente se

considera bajo la categoría de Preocupación Menor (LC-IUCN) debido a su amplia distribución y a no presentar mayores amenazas.

Curiosidades: Excelente cavador, construye galerías de hasta 4 metros. Cerca del año posee glándulas odoríferas cuya secreción utiliza como mecanismo de defensa y de comunicación. Son digitígrados, apoyan solamente los dedos de sus patas al desplazarse. Estas cuentan con una membrana interdigital que los hace ágiles nadadores.

Dónde lo puedo ver: Podemos observarlo en lugares abiertos, cerca de montes o pastizales. Suele acercarse a viviendas rurales.



Alejandro Piña



Carlos Calimares